

**ΣΥΝΘΕΣΗ (β/ο):** ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) 3%, ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (K) 6%, ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 30% (C) ελεύθερα αμινοξέα 15%, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (σε ξηρή ουσία) 60% **Περιέχει επίσης:** Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, S, Cu, γλυκοζίδια, πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, βιταμίνες, 18 διαφορετικά αμινοξέα, κ.λ.π.

Το **ORG 306** είναι πυκνό οργανικό λίπασμα που χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση των φυσιολογικών διεργασιών των φυτών και τη βιολογική ενεργοποίηση του εδάφους.

**Με τη διαφυλλική εφαρμογή επιτυγχάνουμε:**

Τη διέγερση του μεταβολισμού, τη γρηγορότερη ωρίμανση, τη βελτίωση του χρώματος, την αύξηση του μεγέθους των καρπών, την αύξηση του αμύλου, των σακχάρων, κ.λ.π.

**Με την εφαρμογή από το έδαφος επιτυγχάνουμε:**

Την αύξηση της οργανικής ουσίας, την αύξηση του πληθυσμού των μικροοργανισμών και των γαιωσκωλήκων, τη διάσπαση και χουμοποίηση των υπολειμμάτων της προηγούμενης σοδειάς, κ.λ.π.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικό άζωτο και οργανικό κάλι επιτρέπουν την ισορροπημένη λίπανση εξαιτίας της αργής απόδοσης, μειώνοντας παράλληλα τις πιθανότητες απόπλυσης των στοιχείων.


Η ύπαρξη υψηλών ποσοστών γλουταμινικού οξέως ευνοεί την ανάπτυξη των ριζών και την απορρόφηση του αζώτου.

**ΧΡΗΣΗ:** Συνιστάται ο συνδυασμός του με σκευάσματα ιχνοστοιχείων (ειδικά σιδήρου και ασβεστίου) αλλά και λιπασμάτων γιατί επιταχύνει την απορρόφηση και την αφομοίωσή τους. "Όταν συνδιάζεται με διασυστηματικά σκευάσματα βελτιώνει και επιταχύνει τη διεσόδυσή τους. Για την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους συνιστώνται πολλαπλές εφαρμογές και σε μεγάλες δόσεις (μέχρι 10 λιτ./στρ.)

# ORG 306

(3-0-6)

ΠΥΚΝΟ ΥΓΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ  
ΜΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ



**ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ**



Προϊόν του οίκου FITOFARMA ΙΤΑΛΙΑΣ  
Συσκευασία - Διανομή

**ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ® ABEE**

Δυρραχίου 70, 104 43 Αθήνα, Τηλ.: 210 514 2470,  
210 514 2255, Fax: 210 514 3465  
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας,  
Τηλ.: 22620-30 804, Fax: 22620 - 30 805



Μέλος του

ΕΣΥΦ

**ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

**Φυλλώδη λαχανικά:** Ψεκασμός με δόση 350-500 cc/100 λιτ. νερό ανά 7 ημέρες. Υδρολίπανση με 2-3 λιτ./στρ. κάθε βδομάδα. **Καρποφόρα λαχανικά:** Ψεκασμός με δόση 400-600 cc/100 λιτ. νερό ανά 7 ημέρες. Υδρολίπανση με 4-6 λιτ./στρ. πρώτη εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση και τουλάχιστον 3-4 εφαρμογές μετά τη μεταφύτευση ανά 10 ημέρες. **Πατάτα:** Ψεκασμός με δόση 350-500cc/100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση με δόση 2-5 λιτ./στρ. Δύο εφαρμογές αρχίζοντας από το στάδιο μεγέθυνσης του καρπού κάθε 15-20 ημέρες. **Βαμβάκι:** Ψεκασμός με δόση 350-400 cc/100 λιτ. νερό. Υδρολίπανση με δόση 3-5 λιτ./στρ. Τουλάχιστον 2 εφαρμογές πριν την άνθιση κάθε 10-12 ημέρες. **Φυτική Αιγίνης:** Ψεκασμός με δόση 350-500cc/100 λιτ. νερό. Δύο εφαρμογές στο στάδιο της έναρξης του ανοίγματος του καρπού μέχρι τη συγκομιδή ανά 10 ημέρες σε συνδυασμό με κατάλληλα λιπάσματα. **Ελιά:** Ψεκασμός με δόση 350-500cc/100 λιτ. νερό κάθε 15 ημέρες, από την έναρξη γεμίσματος του καρπού. **Τριανταφυλλιά, Γαρυφαλιά:** Υδρολίπανση με δόση 40-70cc/m<sup>2</sup> μετά το κλάδεμα ή τη μεταφύτευση και 20-30 cc/m<sup>2</sup> κάθε 60 ημέρες κατά τη διάρκεια όλων των ανθοφόρων σταδίων. Ενεργοποίηση λιπασμάτων διαφυλλικά: 100-200cc/λιτ.νερό.

**Ενεργοποίηση λιπασμάτων σε υδρολίπανση:**

200-500 cc/100 λιτ. νερό στο μητρικό διάλυμα.

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

Καλύτερος χρόνος ψεκασμού, οι ώρες πριν από τη δύση του ήλιου.

**ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:**

Δεν συνδιάζεται με βορδιγάλειο πολτό, ενώσεις βαρέων μετάλλων και χαλκούχα σκευάσματα.



Περιεχόμενο:

**1** λίτρο